

がん種	レジメン名	薬剤名	投与量	単位	投与経路	投与日	1サイクル
大腸がん (進行・再発)	mFOLFOX6+BEV	ベバシズマブ	5	mg/kg	点滴静注	day1	14日
		レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
		オキサリプラチン	85	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
		5-FU	400	mg/m <sup>2</sup>	急速静注	day1	
		5-FU	2400	mg/m <sup>2</sup>	持続静注	day1~3	
	mFOLFOX6+Panitumumab	パニツムマブ	6	mg/kg	点滴静注	day1	14日
		レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
		オキサリプラチン	85	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
		5-FU	400	mg/m <sup>2</sup>	急速静注	day1	
		5-FU	2400	mg/m <sup>2</sup>	持続静注	day1~3	
	FOLFIRI+BEV	ベバシズマブ	5	mg/kg	点滴静注	day1	14日
		レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
		イリノテカン	150	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
		5-FU	400	mg/m <sup>2</sup>	急速静注	day1	
		5-FU	2400	mg/m <sup>2</sup>	持続静注	day1~3	
	FOLFIRI+RAM	ラムシルマブ	8	mg/kg	点滴静注	day1	14日
		レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
		イリノテカン	150	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
		5-FU	400	mg/m <sup>2</sup>	急速静注	day1	
		5-FU	2400	mg/m <sup>2</sup>	持続静注	day1~3	
	FOLFIRI+Panitumumab	パニツムマブ	6	mg/kg	点滴静注	day1	14日
レボホリナート		200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1		
イリノテカン		150	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1		
5-FU		400	mg/m <sup>2</sup>	急速静注	day1		
5-FU		2400	mg/m <sup>2</sup>	持続静注	day1~3		
XELOX+BEV	ベバシズマブ	7.5	mg/kg	点滴静注	day1	21日	
	オキサリプラチン	130	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1		
	カペシタビン	2000	mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回内服	day1夕~day15朝		
	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	200	mg/body	点滴静注	day1	21日

がん種	レジメン名	薬剤名	投与量	単位	投与経路	投与日	1サイクル
大腸がん (術後)	XELOX	オキサリプラチン	130	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	21日
		カペシタビン	2000	mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回内服	day1夕~day15朝	

東海中央病院 2020/10作成  
2021/3更新  
2023/11更新