

がん種	レジメン名	薬剤名	投与量	単位	投与経路	投与日	1サイクル
大腸がん (進行・再発)	mFOLFOX6+BEV	ベバシズマブ	5	mg/kg	点滴静注	day1	14日
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1	
		オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400	mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	持続静注	day1～3	
	mFOLFOX6+PANI	パニツムマブ	6	mg/kg	点滴静注	day1	14日
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1	
		オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400	mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	持続静注	day1～3	
	FOLFIRI+BEV	ベバシズマブ	5	mg/kg	点滴静注	day1	14日
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1	
		イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400	mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	持続静注	day1～3	
	FOLFIRI+RAM	ラムシルマブ	8	mg/kg	点滴静注	day1	14日
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1	
		イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400	mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	持続静注	day1～3	
	FOLFIRI+PANI	パニツムマブ	6	mg/kg	点滴静注	day1	14日
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1	
		イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400	mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	持続静注	day1～3	
	CAPOX(XELOX)+BEV	ベバシズマブ	7.5	mg/kg	点滴静注	day1	21日
		オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1	
		カペシタビン	2000	mg/m ² /day	1日2回内服	day1夕～day15朝	
	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	200	mg/body	点滴静注	day1	21日
	TAS-102+BEV	ベバシズマブ	5	mg/kg	点滴静注	day1,15	28日
		トリフルリジン・チピラシル	70	mg/m ² /day	1日2回内服	day1夕～day6朝、 day8夕～day13朝	
	ENCO+BINI+CET(初回)	セツキシマブ	400	mg/m ²	点滴静注	day1	7日
		エンコラフェニブ	300	mg/body	1日1回内服	day1～7	
		ビニメチニブ	90	mg/body	1日2回内服	day1～7	
	ENCO+BINI+CET(2回目以降)	セツキシマブ	250	mg/m ²	点滴静注	day1	7日
		エンコラフェニブ	300	mg/body	1日1回内服	day1～7	
		ビニメチニブ	90	mg/body/day	1日2回内服	day1～7	

がん種	レジメン名	薬剤名	投与量	単位	投与経路	投与日	1サイクル
大腸がん (術後)	CAPOX(XELOX)	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1	21日
		カペシタビン	2000	mg/m ² /day	1日2回内服	day1夕～day15朝	
	Cape	カペシタビン	2500	mg/m ² /day	1日2回内服	day1夕～day15朝	21日

東海中央病院 2025/6更新