

がん種	レジメン名	薬剤名	投与量	単位	投与経路	投与日	1サイクル
大腸がん (進行・再発)	mFOLFOX6+BEV	ベバシズマブ	5	mg/kg	点滴静注	day1	14日
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1	
		オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400	mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	持続静注	day1~3	
	mFOLFOX6+PANI	パニツムマブ	6	mg/kg	点滴静注	day1	14日
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1	
		オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400	mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	持続静注	day1~3	
	FOLFIRI+BEV	ベバシズマブ	5	mg/kg	点滴静注	day1	14日
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1	
		イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400	mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	持続静注	day1~3	
	FOLFIRI+RAM	ラムシルマブ	8	mg/kg	点滴静注	day1	14日
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1	
		イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400	mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	持続静注	day1~3	
	FOLFIRI+PANI	パニツムマブ	6	mg/kg	点滴静注	day1	14日
		レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1	
		イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注	day1	
		5-FU	400	mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	持続静注	day1~3	
	CAPOX(XELOX)+BEV	ベバシズマブ	7.5	mg/kg	点滴静注	day1	21日
		オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1	
		カペシタビン	2000	mg/m ² /day	1日2回内服	day1夕~day15朝	
Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	200	mg/body	点滴静注	day1	21日	
TAS-102+BEV	ベバシズマブ	5	mg/kg	点滴静注	day1,15	28日	
	トリフルリジン・チピラシル	70	mg/m ² /day	1日2回内服	day1夕~day6朝、day8夕~day13朝		
ENCO+BINI+CET(初回)	セツキシマブ	400	mg/m ²	点滴静注	day1	7日	
	エンコラフェニブ	300	mg/body	1日1回内服	day1~7		
	ビニメチニブ	90	mg/body	1日2回内服	day1~7		
ENCO+BINI+CET(2回目以降)	セツキシマブ	250	mg/m ²	点滴静注	day1	7日	
	エンコラフェニブ	300	mg/body	1日1回内服	day1~7		
	ビニメチニブ	90	mg/body/day	1日2回内服	day1~7		

IRI+PANI	イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	パニツムマブ	6	mg/kg	点滴静注	day1	

がん種	レジメン名	薬剤名	投与量	単位	投与経路	投与日	1サイクル
大腸がん (術後)	CAPOX(XELOX)	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1	21日
		カペシタビン	2000	mg/m ² /day	1日2回内服	day1夕～day15朝	
	Cape	カペシタビン	2500	mg/m ² /day	1日2回内服	day1夕～day15朝	21日

東海中央病院 2026/4更新